

Drei weitere Impfungen ab 60 Jahre

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

wenn sie 60 Jahre oder älter sind, werden drei zusätzliche
Standardimpfungen empfohlen und von Ihrer Krankenkasse übernommen.

Empfohlene Impfungen ab 60+



Influenza

(Grippe)

wie oft:

Jedes Jahr einmal



Pneumokokken

(Lungenentzündung)

wie oft:

Einmalig (bei Vorerkrankungen
evtl. Auffrischimpfung nötig)



Herpes Zoster

(Gürtelrose)

wie oft:

Zweimalig im Abstand
von 2 bis 6 Monaten

Auffrischimpfungen



COVID

wie oft:

Auffrischimpfung mit
einem mRNA Impfstoff mind.
6 Monate nach letzter Impfung*



Tetanus

(Wundstarrkrampf)

Diphtherie

(echter Krupp, Halsbräune)

Pertussis

(Keuchhusten)

wie oft:

Alle 10 Jahre mit einem
Kombinationsimpfstoff



Die ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut rät bei Personen ab 60 Jahren zur jährlichen Grippeimpfung, zur Impfung gegen Pneumokokken (Lungenentzündung) und zur Impfung gegen Herpes Zoster (Gürtelrose).

Im höheren Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf der Erkrankungen zu. Zu Ihrem eigenen Schutz wird daher eine Impfung empfohlen. Bei bestimmten Vorerkrankungen sollten die Impfungen auch schon vor dem 60. Lebensjahr durchgeführt werden.

Bringen Sie Ihren Impfpass mit und sprechen Sie uns auf die Impfungen an. Gern kontrollieren wir auch, ob noch ein ausreichender Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten besteht.

* Empfehlungen der STIKO beachten